

■当院のがん薬物療法に関する情報共有ツールおよび連携充実加算について

平素は、当院の外来処方せん応需におきまして、ご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。当院では、外来がん化学療法を行う患者さんの治療や情報を病院・保険薬局間で共有できるよう、情報共有書類等を活用した取り組みを行っています。

【患者さんに交付する文書】

①化学療法情報提供書

当院薬剤師が指導時にお渡しします。投与スケジュール・投与量・支持療法・副作用などを記載した説明用紙です。

②抗がん剤治療情報シール（お薬手帳用シール）

当日使用する抗がん薬及び投与量を記載した抗がん剤治療情報をお渡しします。

③副作用確認シール

副作用が発現した場合、必要に応じて副作用情報を記載した手帳用シールをお渡しします。

【保険薬局・当院薬剤部間で使用する文書】

①化学療法情報提供書（薬局用）

初回導入時に当院薬剤師が患者さんへお渡しした化学療法情報提供書と同じ用紙です。予定投与量等の記載をしています。患者さんに保険薬局へお渡しするように依頼しています。

④トレーシングレポート（外来がん薬物療法トレーシングレポート）

がん薬物療法に関し、「緊急性は低いものの情報提供したほうが望ましい」内容をFAXにて集約し、保険薬局と病院間で情報共有を図ります。

※病院ホームページの所定の書式をダウンロードしてご使用ください。

■患者さんから交付文書についてお問い合わせがあった場合は、下記にご連絡ください。

大阪府済生会千里病院 薬剤部
大阪府吹田市津雲台1丁目1番6号
TEL 06-6871-0121（代表）
レジメン担当薬剤師
FAX 06-6871-0537（薬剤部内）

外来腫瘍化学療法診療料1（抗悪性腫瘍剤を注射した場合）

連携充実加算 150点（月1回）

[算定要件]

(1) 化学療法の経験を有する医師又は化学療法に係る調剤の経験を有する薬剤師が、抗悪性腫瘍剤等の副作用の発現状況を評価するとともに、副作用の発現状況を記載した治療計画等の文書を患者に交付すること。

※ 患者に交付する文書には、①実施しているレジメン、②レジメンの実施状況、③抗悪性腫瘍剤等の投与量、④主な副作用の発現状況、⑤その他医学・薬学的管理上必要な事項が記載されていること。

(2) 療養のため必要な栄養の指導を実施する場合には、管理栄養士と連携を図ること。

[施設基準]

(1) 外来腫瘍化学療法診療料1に規定するレジメンに係る委員会に管理栄養士が参加していること。

(2) 地域の保険薬局等との連携体制として、次に掲げる体制が整備されていること。

ア 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンをホームページ等で閲覧できるようにしておくこと。

イ 当該保険医療機関において地域の薬局薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。

ウ 保険薬局等からのレジメンに関する照会等に応じる体制を整備すること。また、当該体制について、ホームページや研修会等で周知すること。

(3) 外来化学療法を実施している医療機関に5年以上勤務し、栄養管理（悪性腫瘍患者に対するものを含む。）に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が勤務していること。

(日本病院薬剤師会ホームページより抜粋)

①化学療法情報提供書

[FOLFIRIレジメン情報提供書]

薬剤名	Day1	Day8	Day14	Day21	Day28
イリリチン	●	●	●	●	●
5-FU	●	●	●	●	●
イリリチン	●	●	●	●	●

● 薬剤師が処方する薬剤は、薬剤師が処方した薬剤を患者が受け取る。● 薬剤師が処方した薬剤は、薬剤師が処方した薬剤を患者が受け取る。● 薬剤師が処方した薬剤は、薬剤師が処方した薬剤を患者が受け取る。

抗がん剤治療情報シール

薬剤名	用法	用量
イリリチン	静注	100mg
5-FU	静注	500mg
イリリチン	静注	100mg

②抗がん剤治療情報シール

年 月 日: 2022年 月 日 ()
 病 名: 胃がん G-SOX
 科 室: 消化器科
 病 床 番 号: 2022-06-0871-0121

持続点滴末梢	ルート	
生理食塩液	100mL	1袋
パ/トの静注	0.75mg	1瓶
デキストラン	0.6mg	3.3m g
高濃製剤処理料	(併用)	
エブリット注射液	100mg	100m g
エブリット注射液	50mg	10m g
ブドウ糖注	5%500mL	1袋
持続点滴末梢	ルート	
生理食塩液	100mL	1袋

③副作用確認シール

副作用確認シール

副作用	程度
嘔吐	軽度 / 中等度 / 重度
下痢	軽度 / 中等度 / 重度
食欲不振	軽度 / 中等度 / 重度
疲労感	軽度 / 中等度 / 重度
発熱	軽度 / 中等度 / 重度
頭痛	軽度 / 中等度 / 重度
手足のしびれ	軽度 / 中等度 / 重度
皮膚の発疹	軽度 / 中等度 / 重度
血尿	軽度 / 中等度 / 重度
腰痛	軽度 / 中等度 / 重度
めまい	軽度 / 中等度 / 重度
呼吸困難	軽度 / 中等度 / 重度
意識障害	軽度 / 中等度 / 重度
その他	軽度 / 中等度 / 重度

④トレーシングレポート

外来がん薬物療法トレーシングレポート

薬剤名	用量	用法	投与回数	副作用
イリリチン	100mg	静注	1回	
5-FU	500mg	静注	1回	
イリリチン	100mg	静注	1回	